

Labetalol

1. Indication

Treats high blood pressure.

2. Instruction to use (How is this drug best taken)

- Take your medicine as directed.
- Missed dose: Take a dose as soon as you remember. If it is almost time for your next dose, wait until then and take a regular dose. Do not take extra medicine to make up for a missed dose
- Store the medicine in a closed container at room temperature, away from heat, moisture, and direct light.

3. Drug-Drug Interaction:

- Do not use this medicine together with verapamil.
- Some medicines can affect how labetalol works. Tell your doctor if you are also using cimetidine, digoxin, nitroglycerin, or other blood pressure medicine (including calcium channel blockers).

4. Side effects

May include: nausea, dizziness, fatigue, and tingling scalp.

5. Precautions

A. Do not stop using this medicine suddenly without asking your doctor

- Advise patient to remain supine during and for up to 3 hours following infusion as drug may cause orthostatic hypotension.
- Tell patient to report symptoms of hypotension.
- Instruct patient who has diabetes or who is fasting (ie, surgery, not eating regularly, or vomiting) to monitor for symptoms of hypoglycemia and report difficulties with glycemic control.
- Advise patient against sudden discontinuation of drug.

لايبیتالول

1. دواعي الاستخدام
يُعالج ارتفاع ضغط الدم.

2. طريقة الاستخدام:

- تناول الدواء وفقًا للإرشادات.
- في حال نسيان جرعة: تناول جرعة حالما تتذكر. إذا اقترب موعد جرعتك التالية، فانتظر حتى ذلك الوقت وتناول الجرعة المعتادة. لا تتناول جرعة إضافية لتعويض الجرعة الفائتة.
- يُحفظ الدواء في عبوة مغلقة في درجة حرارة الغرفة، بعيدًا عن الحرارة والرطوبة والضوء المباشر.

3. التفاعلات الدوائية:

- لا تستخدم هذا الدواء مع فيراباميل.
- قد تؤثر بعض الأدوية على فعالية لايبیتالول. أخبر طبيبك إذا كنت تستخدم أيضًا سيميتيدين، أو ديجوكسين، أو نيتروجليسرين، أو أدوية أخرى لضغط الدم (بما في ذلك حاصرات قنوات الكالسيوم).

4. الآثار الجانبية:

قد تشمل: غثيان، دوار، إرهاق، ووخز في فروة الرأس.

5. الاحتياطات:

- لا تتوقف عن استخدام هذا الدواء فجأة دون استشارة طبيبك.
- يُنصح المريض بالبقاء مستلقيًا أثناء التسريب ولمدة تصل إلى 3 ساعات بعده، فقد يُسبب الدواء انخفاض ضغط الدم الانتصابي.
- يُطلب من المريض الإبلاغ عن أي أعراض انخفاض ضغط الدم.
- يُنصح المريض المصاب بداء السكري أو الصائم (مثلًا: بعد جراحة، أو عدم انتظام في تناول الطعام، أو القيء) بمراقبة أعراض نقص سكر الدم والإبلاغ عن أي صعوبات في ضبط مستوى السكر في الدم.
- يُنصح المريض بعدم التوقف المفاجئ عن تناول الدواء.