



Rivaroxaban

1. Indication:

- Atrial fibrillation/flutter
- Left ventricular thrombus, treatment or prophylaxis
Coronary artery disease
- Venous thromboembolism, treatment

2. Instruction to use (How is this drug best taken)

- Your doctor will tell you how much medicine to use. Do not use more than directed. Take this medicine at the same time each day.
- 2.5 milligram (mg) or 10 mg tablet: Take with or without food.
- 15 mg or 20 mg tablet: Take with food.
- **Missed dose:**
 - Once-daily dose: If you miss a dose or forget to use your medicine, use it as soon as you can on the same day. Do not use extra medicine to make up for a missed dose.
 - Twice-daily dose to prevent serious heart or blood vessel problems (2.5 mg tablet): If you miss a dose, skip the missed dose and take your next dose at your usual time.
 - Twice-daily dose to treat a blood clot (oral liquid or 15 mg tablet): If you miss a dose or forget to use your medicine, use it as soon as you can on the same day. You may take 2 doses at the same time to make up for the missed dose. This is only for people who take a total of 30 mg per day.

3. Drug-Drug Interaction:

Tell your doctor if you are using any of the following:

- Carbamazepine, conivaptan, erythromycin, indinavir, itraconazole, ketoconazole, lopinavir, phenytoin, rifampin, ritonavir, St John's wort
- Another blood thinner (including clopidogrel, enoxaparin, heparin, warfarin)
- NSAID pain or arthritis medicine (including aspirin, celecoxib, diclofenac, ibuprofen, naproxen)

4. Side effects

May include abdominal pain, back pain, dizziness, pruritus, wound secretion, cough, vomiting, and gastroenteritis.

5. Precaution

- Do not stop using this medicine suddenly without asking your doctor.
- Prior any surgical procedure report to doctor who treats you during the use of this medicine.
- This medicine may increase your risk of bleeding. Be careful to avoid injuries that could cause bleeding. Stay away from rough sports or other situations where you could be bruised, cut, or hurt. Brush and floss your teeth gently. Be careful when using sharp objects, including razors and fingernail clippers. Avoid picking your nose. If you need to blow your nose, blow it gently.



ريفاروكسابان

1. دواعي الاستخدام

- الرجفان الأذيني/الرفرفة الأذينية
- جلطة البطين الأيسر، علاج أو وقاية
- مرض الشريان التاجي
- الانصمام الخثاري الوريدي، علاج

2. طريقة الاستخدام:

- سيخبرك طبيبك بالجرعة المناسبة. لا تتجاوز الجرعة الموصوفة. تناول هذا الدواء في نفس الوقت يوميًا.
- أقراص 2.5 مليغرام أو 10 مليغرام: تناولها مع أو بدون طعام.
- أقراص 15 مليغرام أو 20 مليغرام: تناولها مع الطعام.

• الجرعة المنسية:

- إذا كانت الجرعة مرة واحدة يوميًا: إذا فاتتك جرعة أو نسيت تناول دوائك، فاستخدمه في أسرع وقت ممكن في نفس اليوم. لا تستخدم جرعة إضافية لتعويض الجرعة الفائتة.
- إذا كانت الجرعة مرتين يوميًا للوقاية من مشاكل خطيرة في القلب أو الأوعية الدموية (قرص ٢,٥ ملغ): إذا فاتتك جرعة، فتجاوز الجرعة الفائتة وتناول جرعتك التالية في موعدك المعتاد.
- إذا كانت الجرعة مرتين يوميًا لعلاج جلطة دموية (سائل فموي أو قرص ١٥ ملغ): إذا فاتتك جرعة أو نسيت استخدام دوائك، فاستخدمه في أسرع وقت ممكن في نفس اليوم. يمكنك تناول جرعتين في نفس الوقت لتعويض الجرعة الفائتة. هذا مخصص فقط للأشخاص الذين يتناولون ٣٠ ملغ يوميًا.

3. التفاعلات الدوائية:

أخبر طبيبك إذا كنت تستخدم أيًا مما يلي:

- كاربامازيبين، كونيفابتان، إيثروميسين، إندينافير، إيتراكونازول، كيتوكونازول، لوبينافير، فينيتوين، ريفامبين، ريتونافير، نبتة سانت جون
- ممّيع آخر للدم (بما في ذلك كلوبيدوغريل، إينوكسابارين، هيبارين، وارفارين)
- مسكّنات الألم أو التهاب المفاصل من مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (بما في ذلك الأسبرين، سيليكوكسيب، ديكلوفيناك، إيبوبروفين، نابروكسين)

4. الآثار الجانبية:

قد تشمل: ألمًا في البطن، ألمًا في الظهر، دوخة، حكة، إفرازات من الجروح، سعالًا، قيئًا، والتهابًا معويًا.

5. الاحتياطات:

- لا تتوقف عن استخدام هذا الدواء فجأة دون استشارة طبيبك.
- قبل أي إجراء جراحي، أخبر طبيبك الذي يُعالجك أثناء استخدام هذا الدواء.
- قد يزيد هذا الدواء من خطر النزيف. احرص على تجنب الإصابات التي قد تسبب نزيفًا. ابتعد عن الرياضات العنيفة أو المواقف التي قد تُسبب لك كدمات أو جروحًا أو إصابات. نظّف أسنانك بالفرشاة والخيط برفق. توخّ الحذر عند استخدام الأدوات الحادة، بما في ذلك شفرات الحلاقة ومقص الأظافر. تجنّب حكّ أنفك. إذا احتجت إلى تنظيف أنفك، فافعل ذلك برفق.